

Rappel des recommandations opérationnelles en cas d'urgence sanitaire – Covid19

BILANS		
<p>Bilan circonstanciel : Recherche notion de Maladie Infectieuse Contagieuse</p> <p>Si oui : s'équiper des EPI (masque, lunettes, gants) / aérer la pièce / engager un minimum d'équipiers / distanciations physique avec l'entourage / donner à la victime un masque avant le bilan, où lui mettre...</p>	<p>Bilan Urgence Vitale:</p> <p>Procéder à la détection rapide de fièvre avec prise de température (thermomètre frontal à infrarouge)</p>	<p>Bilan complémentaire :</p> <p>Rechercher des signes de Maladie Infectieuse Contagieuse</p> <p>Rechercher des antécédents : maladie cardiaque ou pulmonaire, diabète, immunodéficience/ + 60 ans / obésité / hypertension, cancer, insuffisance rénale/ grossesse</p>

MALAISE	VICTIME INCONSCIENTE ET QUI RESPIRE
<ul style="list-style-type: none"> - Donner un masque à la victime - Demander à la victime de se frictionner les mains au gel hydro alcoolique - Respect des distanciations pour les proches - Aérer si possible la pièce - Prendre la température de la victime - O2 si nécessaire, respecter les règles chez une victime présentant une MIC - Demander un avis médical et préciser si MIC suspectée 	<ul style="list-style-type: none"> - O2 si nécessaire - Surveillance de la respiration en regardant le thorax et abdomen se soulever. <p>Si Covid : Débuter par une administration d'oxygène à l'aide de lunettes O2 avec un débit initial de 1 l/min. Placer un masque chirurgical sur la victime par-dessus les lunettes / Augmenter le débit par palier de 1 l/min pour atteindre une SpO2 ≥ 92 %. / Ne pas dépasser 6 l/min de débit d'O2 avec les lunettes.</p>



**Dans tous les cas.
S'équiper avec les EPI
avant d'intervenir**

VICTIME AYANT PERDU CONNAISSANCE	VICTIME EN ACR EN EQUIPE	VICTIME EN ACR ET SAUVETEUR ISOLE, OU ABSENCE DE FILTRE ANTIBACTERIEN
<ul style="list-style-type: none"> - LVA sans ouverture de la bouche - vérification de la respiration en regardant le thorax et l'abdomen sans se pencher. 	<ul style="list-style-type: none"> - examiner la victime et détermine l'arrêt cardiaque (Inconsciente et ne respire pas) - mettre en œuvre le DAE - placer un masque chirurgical à la victime - se positionner au pied de la victime avant le choc (distance de 1m) - débuter les compressions sans ventilation artificielle - un second secouriste se met à la tête, retire le masque chirurgical placé initialement par le 1er secouriste, puis place l'insufflateur manuel AVEC FILTRE ANTI-BACTERIEN, et le maintien à 2 mains constamment sur le visage pour en assurer l'étanchéité - c'est le secouriste qui réalise les compressions qui appui sur le BAVU pour administrer l'O2 (débit à 15l/min), lors de l'interruption des cycles de massages cardiaques 	<p>Chez l'adulte ne procéder à aucune insufflation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mettre sur la victime un Masque à Haute concentration - Placer un masque chirurgical par-dessus le MHC - Régler le débit d'O2 à 15l/min - Poursuivre les autres gestes de réanimation

